

Keimzelltumoren, Trophoblastische Tumoren und Neoplasien der Gonaden

Region: Deutschland
Zeitraum: 2006 bis 2015
Stand: 07.2016

Ausgewählte Kenngrößen

Inzidenzen bezogen auf 1.000.000 Kinder unter 15 Jahren

Relative Häufigkeit: 566 (3,2 %)
Prozentsatz der Studienpatienten: 96,6 %

Inzidenzen pro Million:

| | Mädchen | Jungen | Gesamt |
|----------------------------------|---------|--------|--------|
| Fallzahlen: | 325 | 241 | 566 |
| Standardisierte Inzidenz*: | 6,2 | 4,4 | 5,3 |
| Kumulative Inzidenz: | 91 | 64 | 77 |
| Inzidenzverhältnis (m/w): | | | 0,7 |

Altersspezifische Inzidenzen pro Million:

| | <1 | 1-4 | 5-9 | 10-14 |
|---------------------|------|-----|-----|-------|
| Inzidenz - Mädchen: | 25,9 | 2,9 | 3,4 | 7,4 |
| Inzidenz - Jungen: | 17,4 | 3,0 | 1,3 | 5,6 |
| Inzidenz - Gesamt: | 21,6 | 2,9 | 2,3 | 6,5 |

Altersmedian bei Diagnose: 9 Jahre 0 Monate

* Standard: Segi-Weltbevölkerung

Jährliche Anzahl der gemeldeten Fälle und Inzidenzen nach Geschlecht

Inzidenzen bezogen auf 1.000.000 Kinder unter 15 Jahren

| Jahr | Fallzahlen | | | Inzidenzen | | |
|------|------------|---------|--------|------------|---------|--------|
| | Jungen | Mädchen | Gesamt | Jungen | Mädchen | Gesamt |
| 2006 | 18 | 30 | 48 | 3,0 | 5,8 | 4,3 |
| 2007 | 19 | 24 | 43 | 3,4 | 4,4 | 3,9 |
| 2008 | 14 | 25 | 39 | 2,5 | 4,4 | 3,4 |
| 2009 | 22 | 33 | 55 | 4,3 | 6,3 | 5,3 |
| 2010 | 28 | 33 | 61 | 5,0 | 5,9 | 5,4 |
| 2011 | 28 | 43 | 71 | 5,0 | 8,1 | 6,5 |
| 2012 | 20 | 35 | 55 | 3,9 | 6,7 | 5,3 |
| 2013 | 38 | 43 | 81 | 7,0 | 8,7 | 7,8 |
| 2014 | 22 | 30 | 52 | 3,8 | 6,0 | 4,9 |
| 2015 | 32 | 29 | 61 | 6,2 | 5,7 | 6,0 |

Alters- und geschlechtsspezifische Inzidenzen

Inzidenzen bezogen auf 1.000.000 Kinder unter 15 Jahren

| Alter | Fallzahlen | | | Inzidenzen | | |
|-------|------------|---------|--------|------------|---------|--------|
| | Jungen | Mädchen | Gesamt | Jungen | Mädchen | Gesamt |
| 0 | 61 | 86 | 147 | 17,4 | 25,9 | 21,6 |
| 1 | 23 | 17 | 40 | 6,6 | 5,1 | 5,8 |
| 2 | 7 | 13 | 20 | 2,0 | 3,9 | 2,9 |
| 3 | 5 | 6 | 11 | 1,4 | 1,8 | 1,6 |
| 4 | 7 | 3 | 10 | 2,0 | 0,9 | 1,4 |
| 5 | 6 | 6 | 12 | 1,7 | 1,8 | 1,7 |
| 6 | 2 | 10 | 12 | 0,5 | 2,9 | 1,7 |
| 7 | 5 | 6 | 11 | 1,3 | 1,7 | 1,5 |
| 8 | 3 | 18 | 21 | 0,8 | 5,0 | 2,9 |
| 9 | 9 | 20 | 29 | 2,3 | 5,5 | 3,9 |
| 10 | 15 | 17 | 32 | 3,8 | 4,6 | 4,2 |
| 11 | 16 | 31 | 47 | 4,1 | 8,3 | 6,1 |
| 12 | 19 | 27 | 46 | 4,8 | 7,1 | 5,9 |
| 13 | 27 | 30 | 57 | 6,7 | 7,8 | 7,2 |
| 14 | 36 | 35 | 71 | 8,7 | 8,9 | 8,8 |

Für einige Patienten fehlen Alters- oder Geschlechtsangaben, so dass es beim Summieren von Fallzahlen zu Differenzen kommen kann.

Diese Seiten werden automatisch erstellt. Sollte Ihnen ein Fehler auffallen, bitten wir Sie, uns umgehend zu informieren.