

Retinoblastome

Region: Deutschland (Daten aus Ostdeutschland werden frühestens ab 1991 einbezogen.)
Zeitraum: 1980 bis 2015
Stand: 07.2016

Ausgewählte Kenngrößen

Inzidenzen bezogen auf 1.000.000 Kinder unter 15 Jahren

Relative Häufigkeit: 1364 (2,4 %)
Prozentsatz der Studienpatienten: -

Inzidenzen pro Million:

| | Mädchen | Jungen | Gesamt |
|----------------------------------|---------|--------|--------|
| Fallzahlen: | 661 | 703 | 1364 |
| Standardisierte Inzidenz*: | 4,1 | 4,2 | 4,1 |
| Kumulative Inzidenz: | 53 | 53 | 53 |
| Inzidenzverhältnis (m/w): | | | 1,1 |

Altersspezifische Inzidenzen pro Million:

| | <1 | 1-4 | 5-9 | 10-14 |
|---------------------|------|-----|-----|-------|
| Inzidenz - Mädchen: | 23,2 | 6,8 | 0,5 | 0,0 |
| Inzidenz - Jungen: | 22,8 | 7,0 | 0,4 | 0,1 |
| Inzidenz - Gesamt: | 23,0 | 6,9 | 0,4 | 0,1 |

Altersmedian bei Diagnose: 1 Jahr 2 Monate

* Standard: Segi-Weltbevölkerung

Alters- und geschlechtsspezifische Inzidenzen

Inzidenzen bezogen auf 1.000.000 Kinder unter 15 Jahren

| Alter | Fallzahlen | | | Inzidenzen | | |
|-------|------------|---------|--------|------------|---------|--------|
| | Jungen | Mädchen | Gesamt | Jungen | Mädchen | Gesamt |
| 0 | 295 | 286 | 581 | 22,8 | 23,2 | 23,0 |
| 1 | 176 | 165 | 341 | 13,5 | 13,3 | 13,4 |
| 2 | 115 | 104 | 219 | 8,7 | 8,3 | 8,5 |
| 3 | 50 | 47 | 97 | 3,8 | 3,7 | 3,8 |
| 4 | 27 | 26 | 53 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 5 | 12 | 15 | 27 | 0,9 | 1,2 | 1,0 |
| 6 | 5 | 4 | 9 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
| 7 | 4 | 6 | 10 | 0,3 | 0,5 | 0,4 |
| 8 | 4 | 6 | 10 | 0,3 | 0,5 | 0,4 |
| 9 | 3 | 1 | 4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| 10 | 2 | 1 | 3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | 3 | 0 | 3 | 0,2 | 0,0 | 0,1 |
| 13 | 2 | 0 | 2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Jährliche Anzahl der gemeldeten Fälle und Inzidenzen nach Geschlecht

Inzidenzen bezogen auf 1.000.000 Kinder unter 15 Jahren

| Jahr | Fallzahlen | | | Inzidenzen | | |
|------|------------|---------|--------|------------|---------|--------|
| | Jungen | Mädchen | Gesamt | Jungen | Mädchen | Gesamt |
| 1980 | 13 | 5 | 18 | 3,3 | 1,4 | 2,4 |
| 1981 | 18 | 22 | 40 | 4,5 | 5,8 | 5,2 |
| 1982 | 16 | 12 | 28 | 4,1 | 3,1 | 3,6 |
| 1983 | 13 | 13 | 26 | 3,3 | 3,5 | 3,4 |
| 1984 | 9 | 17 | 26 | 2,3 | 4,4 | 3,4 |
| 1985 | 23 | 10 | 33 | 5,8 | 2,7 | 4,3 |
| 1986 | 14 | 14 | 28 | 3,5 | 3,8 | 3,6 |
| 1987 | 18 | 22 | 40 | 4,5 | 5,8 | 5,1 |
| 1988 | 22 | 26 | 48 | 5,4 | 6,6 | 6,0 |
| 1989 | 18 | 19 | 37 | 4,2 | 4,7 | 4,4 |
| 1990 | 23 | 10 | 33 | 5,0 | 2,3 | 3,7 |
| 1991 | 19 | 20 | 39 | 3,2 | 3,5 | 3,3 |
| 1992 | 19 | 24 | 43 | 3,3 | 4,3 | 3,8 |
| 1993 | 20 | 23 | 43 | 3,5 | 4,3 | 3,9 |
| 1994 | 21 | 17 | 38 | 3,8 | 3,3 | 3,5 |
| 1995 | 18 | 28 | 46 | 3,4 | 5,6 | 4,5 |
| 1996 | 18 | 12 | 30 | 3,4 | 2,3 | 2,9 |
| 1997 | 22 | 20 | 42 | 4,2 | 4,1 | 4,1 |
| 1998 | 18 | 27 | 45 | 3,4 | 5,4 | 4,4 |
| 1999 | 20 | 20 | 40 | 3,9 | 4,1 | 4,0 |
| 2000 | 27 | 25 | 52 | 5,3 | 5,2 | 5,2 |
| 2001 | 26 | 20 | 46 | 5,0 | 4,0 | 4,5 |
| 2002 | 21 | 16 | 37 | 4,4 | 3,3 | 3,8 |
| 2003 | 25 | 20 | 45 | 5,2 | 4,2 | 4,7 |
| 2004 | 18 | 22 | 40 | 3,7 | 4,9 | 4,3 |
| 2005 | 21 | 18 | 39 | 4,4 | 4,1 | 4,2 |
| 2006 | 18 | 13 | 31 | 3,9 | 3,0 | 3,4 |
| 2007 | 29 | 24 | 53 | 6,3 | 5,7 | 6,0 |
| 2008 | 19 | 8 | 27 | 4,2 | 1,8 | 3,0 |
| 2009 | 22 | 19 | 41 | 4,9 | 4,5 | 4,7 |
| 2010 | 17 | 20 | 37 | 3,8 | 4,8 | 4,3 |
| 2011 | 18 | 11 | 29 | 4,1 | 2,6 | 3,3 |
| 2012 | 20 | 17 | 37 | 4,5 | 4,1 | 4,3 |
| 2013 | 16 | 20 | 36 | 3,5 | 4,7 | 4,1 |
| 2014 | 19 | 15 | 34 | 4,2 | 3,5 | 3,9 |
| 2015 | 25 | 32 | 57 | 5,4 | 7,4 | 6,4 |

Für einige Patienten fehlen Alters- oder Geschlechtsangaben, so dass es beim Summieren von Fallzahlen zu Differenzen kommen kann.

Diese Seiten werden automatisch erstellt. Sollte Ihnen ein Fehler auffallen, bitten wir Sie, uns umgehend zu informieren.