

# Nephroblastome und andere nicht-epitheliale Nierentumoren

**Region:** Deutschland (Daten aus Ostdeutschland werden frühestens ab 1991 einbezogen.)  
**Zeitraum:** 1980 bis 2015  
**Stand:** 07.2016

## Ausgewählte Kenngrößen

### Inzidenzen bezogen auf 1.000.000 Kinder unter 15 Jahren

**Relative Häufigkeit:** 3281 (5,7 %)  
**Prozentsatz der Studienpatienten:** 90,1 %

### Inzidenzen pro Million:

	Mädchen	Jungen	Gesamt
Fallzahlen:	1706	1575	3281
Standardisierte Inzidenz*:	10,0	8,9	9,4
Kumulative Inzidenz:	135	118	126
<b>Inzidenzverhältnis (m/w):</b>			0,9

### Altersspezifische Inzidenzen pro Million:

	<1	1-4	5-9	10-14
Inzidenz - Mädchen:	20,4	20,2	6,0	0,7
Inzidenz - Jungen:	22,0	17,8	4,3	0,7
Inzidenz - Gesamt:	21,2	19,0	5,1	0,7

**Altersmedian bei Diagnose:** 3 Jahre 2 Monate

\* Standard: Segi-Weltbevölkerung

## Alters- und geschlechtsspezifische Inzidenzen

### Inzidenzen bezogen auf 1.000.000 Kinder unter 15 Jahren

Alter	Fallzahlen			Inzidenzen		
	Jungen	Mädchen	Gesamt	Jungen	Mädchen	Gesamt
0	284	251	535	21,9	20,4	21,2
1	276	257	533	21,1	20,7	20,9
2	241	261	502	18,3	20,9	19,6
3	247	237	484	18,6	18,8	18,7
4	175	254	429	13,1	20,0	16,4
5	120	180	300	8,9	14,0	11,4
6	72	83	155	5,3	6,4	5,8
7	46	56	102	3,4	4,3	3,8
8	27	46	73	1,9	3,5	2,7
9	30	24	54	2,1	1,8	2,0
10	19	12	31	1,3	0,9	1,1
11	11	10	21	0,7	0,7	0,7
12	12	10	22	0,8	0,7	0,8
13	7	10	17	0,5	0,7	0,6
14	3	11	14	0,2	0,7	0,5

## Jährliche Anzahl der gemeldeten Fälle und Inzidenzen nach Geschlecht

### Inzidenzen bezogen auf 1.000.000 Kinder unter 15 Jahren

Jahr	Fallzahlen			Inzidenzen		
	Jungen	Mädchen	Gesamt	Jungen	Mädchen	Gesamt
1980	27	34	61	6,2	8,7	7,4
1981	39	25	64	9,1	5,8	7,5
1982	27	33	60	6,5	8,5	7,5
1983	31	34	65	7,6	8,6	8,1
1984	31	33	64	7,6	8,5	8,1
1985	35	41	76	8,7	10,4	9,5
1986	35	35	70	8,5	9,2	8,9
1987	42	35	77	10,2	8,8	9,5
1988	34	37	71	8,3	9,4	8,8
1989	37	37	74	8,4	8,9	8,7
1990	42	39	81	9,3	9,0	9,1
1991	70	53	123	11,5	9,0	10,3
1992	52	54	106	8,6	9,4	9,0
1993	63	50	113	10,6	8,7	9,7
1994	41	65	106	7,0	11,4	9,2
1995	63	51	114	11,1	9,2	10,2
1996	45	62	107	8,1	11,6	9,8
1997	45	59	104	7,9	10,7	9,3
1998	49	59	108	8,7	11,2	9,9
1999	46	51	97	8,4	9,9	9,1
2000	45	54	99	8,1	10,2	9,1
2001	47	58	105	8,9	11,0	9,9
2002	55	63	118	10,0	12,5	11,2
2003	47	46	93	9,0	8,8	8,9
2004	52	51	103	10,2	10,5	10,3
2005	34	38	72	6,8	7,7	7,2
2006	48	52	100	9,4	11,1	10,2
2007	53	52	105	10,7	10,7	10,7
2008	37	51	88	8,0	10,8	9,4
2009	54	56	110	11,7	12,4	12,0
2010	41	39	80	8,3	8,5	8,4
2011	39	45	84	8,2	10,1	9,1
2012	43	62	105	9,1	13,7	11,4
2013	33	42	75	7,0	9,5	8,2
2014	42	52	94	8,9	11,3	10,1
2015	51	58	109	10,7	12,6	11,6

Für einige Patienten fehlen Alters- oder Geschlechtsangaben, so dass es beim Summieren von Fallzahlen zu Differenzen kommen kann.

Diese Seiten werden automatisch erstellt. Sollte Ihnen ein Fehler auffallen, bitten wir Sie, uns umgehend zu informieren.