

Weichteil- und andere extraossäre Sarkome

Region:	Deutschland (Daten aus Ostdeutschland werden frühestens ab 1991 einbezogen.)
Zeitraum:	1980 bis 2015
Stand:	07.2016

Ausgewählte Kenngrößen

Inzidenzen bezogen auf 1.000.000 Kinder unter 15 Jahren

Relative Häufigkeit:	3507 (6,1 %)
Prozentsatz der Studienpatienten:	92,0 %

Inzidenzen pro Million:

	Mädchen	Jungen	Gesamt
Fallzahlen:	1581	1926	3507
Standardisierte Inzidenz*:	8,2	9,6	8,9
Kumulative Inzidenz:	120	139	130
Inzidenzverhältnis (m/w):			1,2

Altersspezifische Inzidenzen pro Million:

	<1	1-4	5-9	10-14
Inzidenz - Mädchen:	13,2	9,3	6,2	7,6
Inzidenz - Jungen:	16,7	11,6	7,6	7,6
Inzidenz - Gesamt:	15,0	10,5	7,0	7,6

Altersmedian bei Diagnose: 6 Jahre 4 Monate

* Standard: Segi-Weltbevölkerung

Alters- und geschlechtsspezifische Inzidenzen

Inzidenzen bezogen auf 1.000.000 Kinder unter 15 Jahren

Alter	Fallzahlen			Inzidenzen		
	Jungen	Mädchen	Gesamt	Jungen	Mädchen	Gesamt
0	215	160	375	16,6	13,0	14,8
1	154	117	271	11,8	9,4	10,6
2	140	125	265	10,6	10,0	10,3
3	155	115	270	11,7	9,1	10,4
4	161	111	272	12,0	8,7	10,4
5	140	97	237	10,4	7,6	9,0
6	105	88	193	7,7	6,8	7,3
7	85	79	164	6,2	6,1	6,1
8	93	72	165	6,7	5,4	6,1
9	102	70	172	7,2	5,2	6,2
10	100	81	181	6,9	5,9	6,4
11	114	114	228	7,8	8,2	8,0
12	101	93	194	6,7	6,5	6,6
13	114	129	243	7,4	8,9	8,1
14	143	124	267	9,1	8,3	8,7

Jährliche Anzahl der gemeldeten Fälle und Inzidenzen nach Geschlecht

Inzidenzen bezogen auf 1.000.000 Kinder unter 15 Jahren

Jahr	Fallzahlen			Inzidenzen		
	Jungen	Mädchen	Gesamt	Jungen	Mädchen	Gesamt
1980	24	28	52	4,3	5,8	5,1
1981	38	34	72	7,8	6,4	7,1
1982	32	27	59	6,2	6,0	6,1
1983	43	27	70	9,2	5,7	7,5
1984	48	24	72	10,2	4,8	7,6
1985	48	34	82	10,3	7,5	8,9
1986	41	37	78	9,3	8,8	9,0
1987	42	38	80	9,4	8,6	9,0
1988	43	33	76	9,4	7,5	8,5
1989	52	44	96	11,4	10,0	10,7
1990	43	42	85	9,0	9,3	9,2
1991	57	49	106	8,7	7,9	8,3
1992	51	56	107	7,6	8,9	8,3
1993	64	37	101	9,5	5,8	7,7
1994	65	49	114	9,7	7,8	8,8
1995	69	50	119	10,6	8,0	9,3
1996	52	37	89	8,1	5,8	7,0
1997	77	58	135	12,3	9,5	10,9
1998	59	58	117	9,5	9,6	9,6
1999	60	51	111	9,4	8,3	8,9
2000	60	48	108	9,5	7,9	8,7
2001	71	53	124	11,1	8,8	10,0
2002	61	56	117	10,2	9,4	9,8
2003	57	41	98	9,6	6,7	8,2
2004	66	60	126	11,5	10,6	11,0
2005	63	49	112	11,1	8,9	10,0
2006	50	45	95	8,7	8,1	8,4
2007	48	46	94	9,0	8,3	8,7
2008	48	52	100	8,6	9,7	9,1
2009	76	52	128	13,6	9,8	11,8
2010	43	35	78	7,9	6,7	7,3
2011	61	55	116	11,2	10,9	11,0
2012	54	43	97	9,9	8,3	9,1
2013	64	41	105	12,1	7,9	10,0
2014	42	56	98	7,9	11,3	9,5
2015	54	36	90	10,6	7,3	9,0

Für einige Patienten fehlen Alters- oder Geschlechtsangaben, so dass es beim Summieren von Fallzahlen zu Differenzen kommen kann.

Diese Seiten werden automatisch erstellt. Sollte Ihnen ein Fehler auffallen, bitten wir Sie, uns umgehend zu informieren.