

Hodgkin-Lymphome

Region: Deutschland
Zeitraum: 2009 bis 2015
Stand: 07.2016

Ausgewählte Kenngrößen

Inzidenzen bezogen auf 1.000.000 Kinder unter 18 Jahren

Relative Häufigkeit: 1100 (7,4 %)
Prozentsatz der Studienpatienten: 97,8 %

Inzidenzen pro Million:

| | Mädchen | Jungen | Gesamt |
|----------------------------------|---------|--------|--------|
| Fallzahlen: | 512 | 588 | 1100 |
| Standardisierte Inzidenz*: | 9,6 | 10,9 | 10,3 |
| Kumulative Inzidenz: | 191 | 212 | 202 |
| Inzidenzverhältnis (m/w): | | | 1,1 |

Altersspezifische Inzidenzen pro Million:

| | <1 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-17 |
|---------------------|-----|-----|-----|-------|-------|
| Inzidenz - Mädchen: | 0,0 | 0,4 | 1,8 | 15,1 | 34,9 |
| Inzidenz - Jungen: | 0,0 | 1,8 | 7,7 | 15,6 | 29,4 |
| Inzidenz - Gesamt: | 0,0 | 1,1 | 4,9 | 15,4 | 32,0 |

Altersmedian bei Diagnose: 15 Jahre 0 Monate

* Standard: Segi-Weltbevölkerung

Jährliche Anzahl der gemeldeten Fälle und Inzidenzen nach Geschlecht

Inzidenzen bezogen auf 1.000.000 Kinder unter 18 Jahren

| Jahr | Fallzahlen | | | Inzidenzen | | |
|------|------------|---------|--------|------------|---------|--------|
| | Jungen | Mädchen | Gesamt | Jungen | Mädchen | Gesamt |
| 2009 | 87 | 78 | 165 | 11,0 | 9,9 | 10,5 |
| 2010 | 83 | 50 | 133 | 10,7 | 6,6 | 8,7 |
| 2011 | 85 | 72 | 157 | 11,0 | 9,5 | 10,3 |
| 2012 | 76 | 68 | 144 | 10,0 | 9,0 | 9,5 |
| 2013 | 78 | 72 | 150 | 10,1 | 9,4 | 9,8 |
| 2014 | 86 | 78 | 164 | 11,2 | 10,2 | 10,7 |
| 2015 | 93 | 94 | 187 | 12,2 | 12,6 | 12,4 |

Alters- und geschlechtsspezifische Inzidenzen

Inzidenzen bezogen auf 1.000.000 Kinder unter 18 Jahren

| Alter | Fallzahlen | | | Inzidenzen | | |
|-------|------------|---------|--------|------------|---------|--------|
| | Jungen | Mädchen | Gesamt | Jungen | Mädchen | Gesamt |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 0,4 | 0,2 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0,4 | 0,0 | 0,2 |
| 3 | 4 | 0 | 4 | 1,6 | 0,0 | 0,8 |
| 4 | 13 | 3 | 16 | 5,3 | 1,3 | 3,3 |
| 5 | 16 | 4 | 20 | 6,4 | 1,7 | 4,1 |
| 6 | 18 | 1 | 19 | 7,2 | 0,4 | 3,9 |
| 7 | 17 | 4 | 21 | 6,7 | 1,7 | 4,3 |
| 8 | 24 | 5 | 29 | 9,4 | 2,1 | 5,8 |
| 9 | 23 | 8 | 31 | 8,8 | 3,2 | 6,1 |
| 10 | 21 | 16 | 37 | 7,9 | 6,3 | 7,1 |
| 11 | 33 | 28 | 61 | 12,1 | 10,8 | 11,5 |
| 12 | 41 | 27 | 68 | 14,8 | 10,3 | 12,6 |
| 13 | 60 | 59 | 119 | 21,3 | 22,1 | 21,7 |
| 14 | 61 | 68 | 129 | 21,5 | 25,2 | 23,3 |
| 15 | 76 | 99 | 175 | 26,5 | 36,4 | 31,3 |
| 16 | 101 | 89 | 190 | 34,8 | 32,3 | 33,6 |
| 17 | 79 | 100 | 179 | 26,8 | 35,8 | 31,2 |

Für einige Patienten fehlen Alters- oder Geschlechtsangaben, so dass es beim Summieren von Fallzahlen zu Differenzen kommen kann.

Diese Seiten werden automatisch erstellt. Sollte Ihnen ein Fehler auffallen, bitten wir Sie, uns umgehend zu informieren.