Ependymome und Tumoren des Plexus chorioideus

Region: Deutschland
Zeitraum: 2009 bis 2015
Stand: 07.2016

Ausgewählte Kenngrößen

Inzidenzen bezogen auf 1.000.000 Kinder unter 18 Jahren

Relative Häufigkeit: 330 (2,2 %)
Prozentsatz der Studienpatienten: 96,7 %

Inzidenzen pro Million:

	Mädchen	Jungen	Gesamt
Fallzahlen:	139	191	330
Standardisierte Inzidenz*:	3,5	4,5	4,0
Kumulative Inzidenz:	57	75	66
Inzidenzverhältnis (m/w):			1,4

Altersspezifische Inzidenzen pro Million:

	<1	1-4	5-9	10-14	15-17
Inzidenz - Mädchen:	11,6	5,5	2,2	1,5	1,7
Inzidenz - Jungen:	10,2	7,7	2,6	3,2	1,5
Inzidenz - Gesamt:	10,9	6,6	2,4	2,4	1,6

Altersmedian bei Diagnose: 4 Jahre 4 Monate

* Standard: Segi-Weltbevölkerung

Jährliche Anzahl der gemeldeten Fälle und Inzidenzen nach Geschlecht

Inzidenzen bezogen auf 1.000.000 Kinder unter 18 Jahren

Jahr	Fallzahlen			Inzidenzen		
	Jungen	Mädchen	Gesamt	Jungen	Mädchen	Gesamt
2009	25	14	39	4,0	2,5	3,3
2010	21	30	51	3,6	5,2	4,4
2011	24	20	44	4,0	3,4	3,7
2012	32	31	63	5,3	5,6	5,4
2013	31	14	45	5,2	2,4	3,8
2014	36	14	50	5,9	2,6	4,3
2015	22	16	38	3,3	2,6	3,0

Alters- und geschlechtsspezifische Inzidenzen

Inzidenzen bezogen auf 1.000.000 Kinder unter 18 Jahren

Alter	Fallzahlen			Inzidenzen		
	Jungen	Mädchen	Gesamt	Jungen	Mädchen	Gesamt
0	25	27	52	10,2	11,6	10,9
1	25	16	41	10,2	6,9	8,6
2	26	13	39	10,6	5,6	8,2
3	15	12	27	6,1	5,2	5,7
4	10	10	20	4,1	4,3	4,2
5	8	3	11	3,2	1,3	2,3
6	8	7	15	3,2	3,0	3,1
7	9	6	15	3,6	2,5	3,1
8	3	7	10	1,2	2,9	2,0
9	5	4	9	1,9	1,6	1,8
10	14	3	17	5,3	1,2	3,3
11	6	4	10	2,2	1,5	1,9
12	5	1	6	1,8	0,4	1,1
13	5	7	12	1,8	2,6	2,2
14	14	5	19	4,9	1,9	3,4
15	5	7	12	1,7	2,6	2,1
16	4	4	8	1,4	1,5	1,4
17	4	3	7	1,4	1,1	1,2

Für einige Patienten fehlen Alters- oder Geschlechtsangaben, so dass es beim Summieren von Fallzahlen zu Differenzen kommen kann.

Diese Seiten werden automatisch erstellt. Sollte Ihnen ein Fehler auffallen, bitten wir Sie, uns umgehend zu informieren.